

Organiza tu comunidad y participa en la prevención de la Teniosis

- Evita la contaminación del suelo con heces humanas, instalando medios adecuados de disposición de excretas, y educando al público sobre su utilización.
- Evita la contaminación del agua o alimentos, con heces humanas o animales.
- Lava y cocina adecuadamente los alimentos antes de consumirlos.
- Promueve la educación sanitaria en tu comunidad para prevenir ésta y otras enfermedades.



REFERENCIAS:

1. Guía de Parasitología. Universidad de Carabobo.
2. www.higiene.edu.uy/ciclipa/parasito/ENTEROPARASITOSIS.htm

Sala Situacional de Salud Dr. Arnoldo Gabaldon

Correo electrónico: sasit.iaes@gmail.com,
Blog: <http://www.iaes.edu.ve/ssituacional>
Teléfonos (58 0243) 2325633 - 2320833, Ext. 141,
Fax: (58 0243) 2326933



DIRECTORIO ACADÉMICO S.A. IAE "DR. ARNOLDO GABALDON"

Dirección Ejecutiva
Dra. Tulia Hernández
direccion.ejecutiva@iaesp.edu.ve

Dirección de Postgrado
Dr. Benny Suárez
direccionacademica@iaes.edu.ve

Dirección de Investigación
Dra. María Naranjo
dirinvestigacion@iaes.edu.ve

Dirección de Interacción Social
Dra. Daisy Camacaro
dirinteraccionsocial@iaes.edu.ve

Coordinación del Área de Epidemiología
Lcda. Liliana Gallego
lgallegos@iaes.edu.ve

Coordinación de Gestión en Salud Pública
Dra. Julia Varela
jvarela@iaes.edu.ve

Coordinación de Salud Ocupacional
e Higiene del Ambiente Laboral
Dra. Gladys Mago
sohal@iaes.edu.ve

Coordinación de Medicina General Integral
Dra. Nairovi Casadiego
ncasadiego@iaes.edu.ve

S.A. IAES "Dr. Arnoldo Gabaldon"

www.iaes.edu.ve

Sala Situacional de Salud Dr. Arnoldo Gabaldon

TENIOSIS




Diseñado por: T.S.U. Salvador Lobato / SPSG / DGI / IAES / Marzo 2009





¿Qué es la TENIOSIS?

- La **teniosis** es una infección intestinal producida por el parásito adulto *Taenia saginata* (tenia de la carne de res) o por *T. solium* (tenia de la carne de cerdo).
- Las larvas de la tenia del cerdo, pueden invadir algunos órganos del cuerpo y producir la **Cisticercosis**.
- Las larvas de la tenia de la vaca que no afectan los tejidos humanos.




Modo de transmisión

- Las persona puede adquirir el parásito de la tenia al consumir carne (res o cerdo) cruda o poco cocida, que esté infectada.
- Si la persona consume carne de res, es probable que adquiera *T. saginata*, pero si consume carne de cerdo, puede infectarse con *T. solium*

Cisticercosis: esta enfermedad se adquiere de varias maneras:

- Si el paciente tiene en su intestino *T. solium*, puede autoinfectarse con los huevos, al llevar sus manos a la boca.
- Al consumir agua o alimentos contaminados con los huevos del parásito.

Ciclo biológico de *Taenia* spp.



¿Cómo se diagnostica?

Para confirmar que una persona está infectada se debe realizar un examen microscópico de sus heces, a través del cual se identifiquen los segmentos del gusano o sus huevos.

En el caso de la cisticercosis se requiere el examen de sangre del paciente o la realización de estudios más especializados (Rayos X, tomografías, y otros)



Tratamiento

Toda persona infectada con este parásito, que presente síntomas o no, debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

Se utilizan medicamentos distintos para la teniosis y para la neurocisticercosis.



Compilado: Prof. Ana G. Pérez R.
Colaboración: Lic. Daniela Ecarri y
 Lcdo. Rafael Campins
 Maracay, noviembre 2008